

2024 年 3 月 14 日

新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目を新たに受託開始させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後も弊社では皆様方のご要望にお応えできるよう、検査内容を充実させて参りますので、何卒お引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

【新規受託項目】

コードNo.	検査項目名
14021 (従来システム 6379)	アポリポ蛋白A2(APOA2)アイソフォーム

アポリポ蛋白 A2(APOA2)は高比重リポ蛋白の構成成分で、77 個のアミノ酸からなり、カルボキシル(C)末端にアラニン(A)、スレオニン(T)、グルタミン(Q)のアミノ酸配列を持つ二量体のタンパク質です。

血液中の APOA2 は全長のタンパク質と、C 末端のアミノ酸配列が変化した APOA2 アイソフォーム(APOA2-i)の 5 種類(TQ/TQ、AT/TQ、AT/AT、AT/A、A/A)が存在し、健常人では TQ/TQ、AT/TQ、AT/AT の 3 種類が多くを占めています。

膵癌患者では血液中の各 APOA2 アイソフォーム量が増加することや、質量分析法により APOA2-AT 濃度と APOA2-TQ 濃度の比(APOA2-AT/TQ)が減少することが明らかになり、本検査(EIA 法)で測定した APOA2-AT 濃度と APOA2-TQ 濃度の相乗平均値(APOA2-i INDEX)と相関することが報告されています。

本検査は、腫瘍による膵外分泌機能の変化から生じた APOA2 アイソフォームの変化を捉えることにより、既存の腫瘍マーカー(CA19-9)では捉えられない膵癌を検出することが期待されます。

【開始時期】 2024 年 3 月 27 日（水）ご依頼分より

尚、詳細につきましては、営業担当者またはインフォメーションまでお問い合わせ下さい。

本社 〒710-0834 倉敷市笹沖 468 番地の 5

インフォメーション TEL(086)427-2323

ホームページ <http://www.oml-inc.jp>

【受託要領】

コード No. (括弧内は 従来システムコード)	(親)14021 (6379) APOA2 アイソフォーム
	(子)22817 (6380) AT (子)22818 (6381) TQ (子)22819 (6382) INDEX
検体量	血清 0.5mL
採取容器	B (汎用容器 (分離剤入り))
保存方法	冷蔵
検査方法	EIA法
基準範囲	AT : なし TQ : なし INDEX : 59.5以上
単位	μ g/mL
所要日数	4～10日
報告範囲	AT : 3.25～最終値 TQ : 5.75～最終値 INDEX : 0.0～最終値
報告桁数	AT : 小数第2位 TQ : 小数第2位 INDEX : 小数第1位
検査実施料/判断料	335点 /144点 (生化学的検査 (Ⅱ))
	ア. 本検査は、以下の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する者に対して、膵癌の診断の補助を目的として、血液を検体として測定した場合に、膵癌の診断の確定までの間に原則として1回を限度として算定できる。本検査を実施するに当たっては、関連学会が定める指針を遵守するとともに、膵癌を疑う医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (イ) 関連学会が定める指針に基づき膵癌の高度リスクに該当する者。 なお、本検査を実施する患者が3月以内にCA19-9検査を行われており、CA19-9の値が37.0U/mL以上である場合には、本検査は算定できない。 (ロ) 関連学会が定める指針に基づき膵癌の中等度リスクに該当する者であって、癌胎児性抗原 (CEA) 検査の結果が陰性であり、CA19-9値が37.0U/mL以上かつ100U/mL以下の者。 (ハ) 関連学会が定める指針に基づき膵癌のリスク因子が3項目以上該当する者であって、癌胎児性抗原 (CEA) 及びCA19-9検査の結果が陰性である者。 イ. 本検査と、癌胎児性抗原 (CEA)、DUPAN-2又はSPan-1を併せて測定した場合は主たるもののみ算定する。 ウ. 本検査をアの(イ)に対して実施する場合はCA19-9の測定年月日及び測定結果を、アの(ロ)及び(ハ)に対して実施する場合は癌胎児性抗原 (CEA) 及びCA19-9の測定年月日並びに測定結果を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

《検査方法の参考文献》

十亀麻子, 他:医学と薬学 80, 1089-1096, 2023.

以上